

**Influensavaccination - ordination enligt generellt direktiv 2019**Patienter från HälsoBrunnen vårdcentral

Gäller för vaccination mot säsongsinfluensa, se SOSFS 1997:21 (M) och 3 kap. 9 § SOSFS 2000:1 Sjuksköterska ska använda det underlag för behovsbedömning som tagits fram av Folkhälsomyndigheten.

**Indikationer (Vuxna och barn över 6 månader):**

Nedanstående grupper är mer eller mindre heterogena och i vissa fall kommer det krävas en individuell bedömning.

- Personer över 65 år
- Patienter med kronisk hjärt - och/eller lungsjukdom (så som KOL - astma)
- Diabetes mellitus
- Kraftig nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling
- Kronisk lever-eller njursvikt
- Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft/ sekretstagnation till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder
- Gravida efter graviditetsvecka 16

OBS! Patienter som behandlas med cytostatika (cellhämmande läkemedel) eller som reagerade med svimning, yrsel, andnöd eller utslag vid vaccination ska hänvisas till läkare för enskild ordination!

Läkaren behöver inte vara närvarande vid vaccination enligt VGR smittskyddsenhets rekommendationer.

**Kontraindikationer**

Överkänslighet mot ägg eller någon annan av vaccinets beståndsdelar.  
Vid febersjukdom skall vaccineringen senareläggas.

Akutläkemedel Emerade (Adrenalin) i förfylld spruta 0,3mg skall finnas tillgänglig vid vaccination

**Dosering**

Vaccination mot säsongsinfluensa, VAXIGRIP TETRA 0,5 ml,

Ges intramuskulärt i överarmens deltoideusmuskel.

Vid behandling med Waran, Eliquis, Pradaxa eller Xarelto eller annan blodförtunnande medicin ges vaccinet djupt subcutant.

Vaccinet omskakas och ges rumstempererat.

Datum: 19/11/18

Medicinskt ansvarig läkare: [Signature]

Läkemedelsföreskriften (Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:37) om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården) möjliggör ordination enligt generella direktiv i 6 kap. 6 §.